

Echelle UPPS (version femme)

**Rochat, L., Beni, C., Billieux, J., Azouvi, P., Annoni, J.-M., & Van der Linden, M. (2010).
Assessment of impulsivity after moderate to severe traumatic brain injury. *Neuropsychological
Rehabilitation, 20*, 778-797.**

Pour tout renseignement, contacter:

Lucien Rochat, Ph.D.
Unité de Psychopathologie et de Neuropsychologie Cognitive
Université de Genève
40, Boulevard du Pont d'Arve
1205 Genève, Suisse

Lucien.Rochat@unige.ch

Clé de cotation :

Urgence : 3, 5, 10, 13
Manque de préméditation : 1(R), 6(R), 11(R), 16(R)
Manque de persévérance : 4(R), 7(R), 9(R), 14(R)
Recherche de sensation : 2, 8, 12, 15.

Date: _____

Nom de la patiente: _____

Lien avec patiente (époux, fils/fille, etc.): _____

CONSIGNES

Sur ces feuilles, vous trouverez une liste de propositions décrivant le comportement d'une personne. Lisez chaque phrase attentivement. En utilisant l'échelle ci-dessous, entourez le chiffre qui correspond à la fréquence à laquelle votre proche a présenté le comportement décrit. Évaluez le comportement de votre proche **AVANT L'ACCIDENT** et **ACTUELLEMENT**.

Veillez s'il vous plaît répondre à chaque proposition. Merci de votre collaboration.

Exemple

Si avant l'accident votre proche n'était presque jamais été distraite, alors entourez le chiffre 1 dans la colonne intitulée « AVANT L'ACCIDENT ». Si actuellement, votre proche est souvent distraite, alors entourez le chiffre 3 dans la colonne intitulée « ACTUELLEMENT ». L'exemple ci-dessous illustre la manière dont ces réponses doivent être inscrites sur les feuilles :

Avant l'accident				Enoncé	Actuellement			
Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours		Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
①	2	3	4	elle est distraite	1	2	③	4

Si vous voulez changer une réponse que vous avez déjà entourée, faites une croix sur la réponse incorrecte et entourez ensuite le chiffre correct. L'exemple ci-dessous illustre comment changer une réponse si nécessaire:

Avant l'accident				Enoncé	Actuellement			
Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours		Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
1	②	3	4	elle est distraite	1	2	③	4

Avant l'accident				Énoncé	Actuellement			
Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours		Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
1	2	3	4	Elle réfléchit soigneusement avant de faire quoique ce soit	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle aime faire des choses qui sont un petit peu effrayantes	1	2	3	4
1	2	3	4	Quand elle est contrariée, elle agit sans réfléchir	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle préfère mener les choses jusqu'au bout	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle aggrave les choses parce qu'elle agit sans réfléchir quand elle est contrariée	1	2	3	4
1	2	3	4	Sa manière de penser est réfléchie et méticuleuse	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle achève ce qu'elle commence	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle éprouve du plaisir à prendre des risques	1	2	3	4
1	2	3	4	Une fois qu'elle commence un projet, elle le termine	1	2	3	4
1	2	3	4	Quand la discussion s'échauffe, elle dit des choses qu'elle regrette ensuite	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle se décide après un raisonnement bien mûri	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle recherche des expériences et des sensations nouvelles et excitantes	1	2	3	4

Avant l'accident				Énoncé	Actuellement			
Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours		Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
1	2	3	4	Elle fait des choses sur un coup de tête qu'elle regrette par la suite	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle est productive et termine son travail	1	2	3	4
1	2	3	4	Elle se réjouit des expériences et sensations nouvelles même si elles sont un peu effrayantes et non-conformistes	1	2	3	4
1	2	3	4	Avant de se décider, elle considère tous les avantages et inconvénients	1	2	3	4

A remplir par le(la) clinicien(ne)

No patiente:

d

âge patiente:

temps écoulé depuis l'accident (mois):

durée APT (jr):

nombre d'années d'études:

score GCS:

latéralité:

neuroimagerie (IRM ou CT-scan, entourez ce qui convient, si autre: précisez): décrire les résultats des clichés:

médication (anxiolytique, antidépresseur, neuroleptique): précisez le nom du (des) médicament(s) et dosage:
